Calcolo Numerico A - a.a. 2008/09

Giovedì 14 maggio 2009

Integrazione numerica

Formule di Newton-Cotes

La formula dei trapezi e la formula di Cavalieri-Simpson sono casi particolari delle formule di **Newton-Cotes**,

- si introducono $n + 1$ nodi **equispaziati** $\xi = a + i \frac{b-a}{n} \in [a, b]$, $i = 0, \dots, n$;
- si costruisce il polinomio interpolatore $(x_i, f(x_i))$, $i = 0, \dots, n$

Osservazione

Essendo i nodi equispaziati, i pesi α_i nella formula $\sum_{i=0}^n \alpha_i f(x_i)$ dipendono solo da n e da h .

Osservazione

- ($n = 0$) : *Formula del punto medio*
- ($n = 1$) : *Formula del trapezio*
- ($n = 2$) : *Formula di Cavalieri-Simpson*

Formula (del punto medio)

$$I_{PM}(f) = (b-a)f\left(\frac{b+a}{2}\right), \quad E_0 = \int_a^b f dx - I_{PM}(F) = \frac{(b-a)^3}{24} f''(\xi)$$

Grado di precisione: $r = 1$.

Formula (del trapezio)

$$I_{TR}(f) = \frac{(b-a)}{2} [f(a) + f(b)], \quad E_1 = \int_a^b f dx - I_{TR}(f) = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi)$$

Grado di precisione : $r = 1$.

Formula (di Cavalieri-Simpson)

$$I_{CS} = \frac{(b-a)}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right], \quad E_2 = \int_a^b f dx - I_{CS} = -\frac{1}{90} \left(\frac{b-a}{2}\right)^5 f^{(iv)}(\xi)$$

Grado di precisione: $r = 3$

Integrazione numerica

Formula del punto medio composita

Formula (del punto medio composita)

$$I_{PM}^N(f) = \frac{b-a}{N} \sum_{j=1}^N f(m_j) = H \sum_{j=1}^N f(m_j)$$

dove $H = (b-a)/N$, $m_j = a + \frac{2j-1}{2}H$ e $T_j = [a + (j-1)H, a + jH]$ ($j = 1, \dots, N$).

$$\int_a^b f(x) dx - I_{PM}^N(f) = \frac{(b-a)}{24} H^2 f''(\hat{\xi})$$

Formula (dei trapezi composita)

$$I_{TR}^N(f) = \frac{H}{2} \left[f(a) + 2 \sum_{j=1}^{N-1} f(z_j) + f(b) \right]$$

dove $z_j = a + jH$ e $H = (b-a)/N$ ($j = 1, \dots, N$).

$$\int_a^b f(x) dx - I_{TR}^N(f) = -\frac{H^2}{12} (b-a) f''(\hat{\xi})$$

Formula (di Cavalieri-Simpson composta)

$$I_{CS}^N(f) = \frac{H}{6} \sum_{j=1}^N [f(z_{j-1}) + 4f(m_j) + f(z_j)]$$

dove $H = (b - a)/N$, $z_j = a + jH$, $m_j = a + \frac{2j-1}{2}H$ ($j = 1, \dots, N$).

$$\int_a^b f(x) dx - I_{CS}^N(f) = -\frac{b-a}{180} \left(\frac{H}{2}\right)^4 f^{(iv)}(\hat{\xi})$$

Teorema (sulle formule di Newton-Cotes composite)

Data una formula di Newton-Cotes composta

- con n *pari* allora
 - ▶ ha grado di precisione $n + 1$
 - ▶ ha ordine di infinitesimo $n + 2$
- con n *dispari* allora
 - ▶ ha grado di precisione n
 - ▶ ha ordine di infinitesimo $n + 1$

Esempio (Formule composite)

- *Per la Formula del punto medio ($n = 0$) troviamo*
 - ▶ *grado di precisione 1*
 - ▶ *ha ordine di infinitesimo 2*
- *Per la Formula del trapezio ($n = 1$) troviamo*
 - ▶ *grado di precisione 1*
 - ▶ *ha ordine di infinitesimo 2*
- *Per la Formula di Cavalieri-Simpson ($n = 2$) troviamo*
 - ▶ *grado di precisione 3*
 - ▶ *ha ordine di infinitesimo 4*

Integrazione numerica

Stima a posteriori dell'errore per le formule composite

Osservazione

Se l'errore di quadratura è un infinitesimo di ordine $k > 1$ per $H = \frac{b-a}{N} \rightarrow 0$, allora

$$I(f) - I^{2N}(f) \approx \frac{1}{2^k - 1} [I^{2N}(f) - I^N(f)]$$

Vediamo che succede quando si lavora con la formula dei trapezi composta. Sia $H = (b-a)/N$. Posto $I(f) = \int_a^b f(x) dx$, si ha

$$I(f) - I_{TR}^N(f) = -\frac{b-a}{12} H^2 f''(\hat{\xi})$$

$$I(f) - I_{TR}^{2N}(f) = -\frac{b-a}{12} \left(\frac{H}{2}\right)^2 f''(\hat{\xi})$$

e quindi, se $f''(\hat{\xi}) \approx f''(\hat{\eta})$, si ha

$$I(f) - I_{TR}^{2N}(f) \approx \frac{1}{4} [I(f) - I_{TR}^N(f)]$$

$$\begin{aligned} I(f) - I_{TR}^{2N}(f) &\approx \frac{1}{4} \left[I(f) - I_{TR}^N(f) \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[I(f) - I_{TR}^{2N}(f) + I_{TR}^{2N}(f) - I_{TR}^N(f) \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[I(f) - I_{TR}^{2N}(f) \right] + \frac{1}{4} \left[I_{TR}^{2N}(f) - I_{TR}^N(f) \right] \end{aligned}$$

e quindi

$$\frac{3}{4} \left[I(f) - I_{TR}^{2N}(f) \right] \approx \frac{1}{4} \left[I_{TR}^{2N}(f) - I_{TR}^N(f) \right]$$

e infine

$$\left[I(f) - I_{TR}^{2N}(f) \right] \approx \frac{1}{3} \left[I_{TR}^{2N}(f) - I_{TR}^N(f) \right]$$

Si osservi che $\frac{1}{3} = \frac{1}{2^2 - 1}$

Integrazione numerica

Formule di Gauss

Una formula di quadratura è una identità approssimata del tipo

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n \alpha_i f(x_i)$$

Osservazione

Per le formule di Newton-Cotes

- *i nodi sono equispaziati $x_i = a + i \frac{b-a}{n}$ $i = 0, \dots, n$*
- *i pesi α_i si ottengono costruendo il polinomio di grado n che passa per $(x_i, f(x_i))$, $i = 0, \dots, n$*
- *il grado di precisione è n , e questo dipende dal fatto che i parametri liberi sono $n + 1$*

Osservazione

Una strategia alternativa consiste nel determinare

- *gli $n + 1$ nodi x_i*
- *gli $n + 1$ coefficienti α_i*

in modo da ottenere un grado di precisione più alto, pari a $2n + 1$, in quanto abbiamo $2n + 2$ parametri liberi.

Teorema

Data una formula interpolatoria con $n + 1$ nodi, il suo grado di precisione p è t.c.

$$n \leq p \leq 2n + 1.$$

Che sia maggiore o uguale a n è noto.

Siano x_i $i = 0, \dots, n$ i nodi. Sia $q(x) \in \mathbb{P}_{2(n+1)}$ dato da $q(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)^2$ si ha

$$\int_a^b q(x) dx > 0, \quad \sum_{i=0}^n \alpha_i q(x_i) = 0$$

e quindi la precisione deve essere inferiore o uguale a $2n + 1$. □

Integrazione numerica

Formule di Gauss

I polinomi di Legendre $L_k(x) \in \mathbb{P}_k$ sono definiti in modo ricorsivo

$$L_0(x) = 1$$

$$L_1(x) = x$$

$$L_{k+1}(x) = \frac{2k+1}{k+1}xL_k(x) - \frac{k}{k+1}L_{k-1}(x), \quad k = 2, 3, \dots$$

Osservazione

Il polinomi di Legendre sono tra loro *ortogonali*, nel senso che

$$\int_{-1}^1 L_i(x)L_j(x) dx = 0, \quad \text{se } i \neq j.$$

Osservazione

- Gli $n + 1$ nodi della formula di quadratura di Gauss sono le radici del polinomio di Legendre L_{n+1} .
- Queste radici del polinomio L_{n+1} sono tutte distinte e cadono tutte in $[-1, 1]$.

Integrazione numerica

Formule di Gauss

Teorema (La formula di Gauss ha grado di precisione $2n + 1$)

Se $\sum_{i=0}^n \alpha_i^G f(x_i^G)$ è la formula di Gauss sull'intervallo $[-1, 1]$ relativa a $n + 1$ nodi, allora il suo grado di precisione è $2n + 1$.

Sia $p(x) \in \mathbb{P}_{2n+1}$: dobbiamo provare che

$$\int_{-1}^1 p(x) dx = \sum_{i=0}^n \alpha_i^G p(x_i^G).$$

Sappiamo che

$$p(x) = q(x)L_{n+1}(x) + r(x), \quad q(x), r(x) \in \mathbb{P}_n$$

e (vedi la definizione ricorsiva)

$$q(x) = \sum_{k=0}^n c_k L_k(x), \quad c_k \in \mathbb{R}$$

e quindi

$$p(x) = \sum_{k=0}^n c_k L_k(x)L_{n+1}(x) + r(x)$$

Integrazione numerica

Formule di Gauss

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 p(x) dx &= \sum_{k=0}^n c_k \int_{-1}^1 L_k(x) L_{n+1}(x) dx + \int_{-1}^1 r(x) dx \\ &= \int_{-1}^1 r(x) dx \\ &= \sum_{i=0}^n \alpha_i^G r(x_i^G), \quad [\text{il grado di precisione} \geq n] \\ &= \sum_{i=0}^n \alpha_i^G [q(x_i^G) L_{n+1}(x_i^G) + r(x_i^G)] \quad [L_{n+1}(x_i^G) = 0, i = 0, \dots, n] \\ &= \sum_{i=0}^n \alpha_i^G p(x_i^G)\end{aligned}$$

Integrazione numerica

Formule di Gauss

I nodi e i pesi delle formule di Gauss su $(-1, 1)$ sono tabulati.

Numero nodi	Nodi	Pesi
1	0	$\frac{1}{2}$
2	$-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}$	1, 1
3	$-\frac{3}{\sqrt{5}}, 0, \frac{3}{\sqrt{5}}$	$\frac{5}{9}, \frac{8}{9}, \frac{5}{9}$
...		

Osservazione

Si osservi che, quando $n = 1$, si ritrova la formula del punto medio: è una particolare formula di Gauss (che non fosse interpolatoria, era evidente).

Osservazione

I nodi nella formula di Gauss sono simmetrici rispetto al punto medio.

Integrazione numerica

Formule di Gauss

Ricordiamo che

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \left[1 \cdot f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + 1 \cdot f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \right].$$

Osservazione (Formula di Gauss con 2 nodi)

Se devo calcolare con la formula di Gauss $\int_a^b f(x) dx$, con $[a, b] \neq [-1, 1]$, allora il cambiamento di variabili $x \rightarrow t$ dato da $x = \frac{a+b}{2} + t \frac{b-a}{2}$ permette di scrivere

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{a+b}{2} + t \frac{b-a}{2}\right) dx \\ &\approx \frac{b-a}{2} [f(\hat{x}_0) + f(\hat{x}_1)] \\ &= I_G(f) \end{aligned}$$

dove $\hat{x}_0 = \frac{a+b}{2} - \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{b-a}{2}$ e $\hat{x}_1 = \frac{a+b}{2} + \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{b-a}{2}$

Osservazione

L'errore di quadratura è

$$I(f) - I_G(f) = \frac{(b-a)^5}{4320} f^{(iv)}(\xi)$$

ove $\xi \in [a, b]$ opportuno

Esercizio

Calcolare $I_G(f)$ dove $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ nel caso in cui i nodi siano 3

Osservazione

Più in generale, nel caso di $n + 1$ nodi e $f \in C^{n+2}$, si ha

$$I(f) - I_G(f) = \left[\int_a^b L_{n+1}^2(x) dx \right] \frac{1}{(2n+2)!} f^{(2n+2)}(\xi)$$

ove $\xi \in [a, b]$ opportuno